

6CCSDCOSMT15.P

SINAIS DE ÍNTIMA RELAÇÃO DOS TERCEIROS MOLARES COM O CANAL MANDIBULAR EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA

Amanda Maria Medeiros de Araujo ⁽²⁾; Luciana Vilar de Oliveira ⁽²⁾; Kalianna Pereira de França ⁽²⁾; Lúcio Flávio da Cunha Félix ⁽⁴⁾; Maria Luiza dos Anjos Pontual ⁽³⁾.

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Clínica e Odontologia Social/MONITORIA

RESUMO

A exodontia dos terceiros molares inferiores é passível de muitas complicações, sobretudo em relação ao dano ao nervo alveolar inferior, que pode manifestar-se como parestesia no lábio inferior e mento. A parestesia geralmente é de curta duração, mas pode estender-se e, em raras ocasiões, ser permanente. A íntima relação das raízes do dente com o canal mandibular constitui uma das principais causas do dano ao nervo alveolar inferior, sendo importante um estudo do relacionamento dos terceiros molares inferiores com o canal mandibular, previamente à cirurgia. A radiografia panorâmica é considerada uma excelente técnica radiográfica, na identificação e localização dos terceiros molares. Estudos recentes, utilizando-se radiografias panorâmicas, propuseram sinais radiográficos de íntima relação dos ápices dos terceiros molares com o canal mandibular. Portanto, é objetivo neste trabalho, apresentar imagens de radiografias panorâmicas que servem como indício de íntima relação do terceiro molar inferior com o canal mandibular.

Palavras-chave: Radiografia panorâmica, Nervo alveolar, Cirurgia.

⁽¹⁾ Monitor(a) Bolsista, ⁽²⁾ Monitor Voluntário, ⁽³⁾ Prof(a) Orientador(a)/Coordenador(a).