

6CCSDMMT02.P**CISTOS TONSILARES DA JUNÇÃO CRÂNIO-CERVICAL NA IMPRESSÃO BASILAR, MALFORMAÇÃO DE CHIARI E SIRINGOMIELIA**

Luiz Márcio de Brito Marinho Segundo⁽¹⁾; Máspoli de Souza Filho⁽²⁾; Daniel de Araújo Paz⁽²⁾; Davi Veloso Guerra⁽²⁾; Daniel Espíndola Ronconi⁽²⁾; Thiago Figueiredo de Castro⁽²⁾; Stênio Abrantes Sarmento⁽³⁾; Maurus Marques de Almeida Holanda⁽³⁾
Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Morfologia/MONITORIA

RESUMO

As malformações crânio-cervicais correspondem a defeitos morfológicos esqueléticos e nervosos resultantes do desenvolvimento intrínseco anormal da junção crânio-cervical, dentre elas destacam-se a platibasia, a impressão basilar e a malformação de Chiari. A impressão basilar é uma anomalia que consiste na projeção do forame magno para o interior da fossa craniana posterior, estando associada a outras anomalias como siringomielia, platibasia, assimilação do atlas, soldadura das vértebras cervicais (síndrome de Klippel-Feil) e malformação de Chiari. A platibasia consiste no aplainamento da base do crânio, quando a abertura do ângulo basal de Boogard encontra-se superior a 140°. A malformação de Chiari corresponde à herniação das tonsilas cerebelares através do forame magno. A siringomielia consiste em uma cavitação centromedular patológica. Objetiva-se com este trabalho demonstrar a correlação anátomo-clínica existente na presença de cistos tonsilares encontrados nessas malformações crânio-cervicais. Foi observada a presença de cistos tonsilares no acesso cirúrgico suboccipital à fossa posterior durante o tratamento cirúrgico dos pacientes portadores de malformação crânio-cervical que se apresentavam sintomáticos. Os dados obtidos foram analisados em comparação com trabalhos clássicos na literatura anatômica e cirúrgica. De acordo com o estudo realizado, é possível que esses cistos causem transtornos da circulação líquórica local, auxiliando também na compressão local patológica, responsável pelas queixas dos pacientes. A partir disso, torna-se relevante o conhecimento da neuroanatomia em vista das possíveis implicações clínicas que a presença desses cistos possam acarretar, o que, trazido para as aulas práticas de neuroanatomia, desperta um maior interesse dos acadêmicos acerca das patologias que podem comprometer a estrutura anatômica normal.

Palavras-chave: Cistos tonsilares; Malformações crânio-cervicais; Neuroanatomia.

⁽¹⁾Monitor(a) Bolsista; ⁽²⁾Monitor(a) Voluntário(a); ⁽³⁾Prof(a) Orientador(a)/Coordenador(a).