

6CCSDORMT09.P**AVULSÃO DENTÁRIA: COMO PROCEDER DE MANEIRA ADEQUADA?**

Calina de Almeida Japiassu Alves⁽²⁾, Rafaela Carla Venâncio Viana⁽²⁾, Fernanda Maria Bezerra⁽¹⁾, Ângelo Brito Pereira de Melo⁽³⁾, Clêucio Vieira Maurício⁽⁴⁾.

Centro de Ciências da Saúde/ Departamento de Odontologia Restauradora/ MONITORIA

A avulsão é o completo deslocamento do dente para fora do alvéolo, sendo os dentes mais comumente atingidos são os permanentes da dentição jovem, pois o desenvolvimento radicular ainda está incompleto e o periodonto ainda é bastante resiliente. Sob estas circunstâncias, mesmo impactos horizontais fracos podem resultar no total deslocamento do dente. A incidência da avulsão dentária varia de 1% a 16% de todas as lesões traumáticas da dentição permanente. Como na maioria dos traumas dentais, os incisivos centrais superiores são os dentes mais freqüentemente avulsionados na dentição permanente. Os acidentes esportivos e automobilísticos são apontados como as causas mais freqüentes, atingindo, principalmente, o grupo etário compreendido entre 7 e 12 anos. Uma vez avulsionado um dente, a proposta terapêutica consiste no seu reimplante, desde que a situação clínica seja adequada ou propícia a este. O resultado de um eventual procedimento de reimplante é quase inteiramente dependente do período e da manipulação extra-alveolar, fatores estes que podem ocasionar um processo de reabsorção. Desse modo como proceder de maneira adequada, após esse trauma grave é essencial para impedir possíveis reabsorções que podem ocorrer de modo definitivo ao dente avulsionado.

Palavras-chave: Avulsão Dentaria; Alvéolo; Dente.

⁽¹⁾ Monitor(a) Bolsista(a); ⁽²⁾ Monitor(a) Voluntário(a); ⁽³⁾ Prof(a) Orientador(a)/Coordenador(a); ⁽⁴⁾ Prof(a) Colaborador(a).