

PREVALÊNCIA DAS ALTERAÇÕES VOCAIS EM PACIENTES EM PACIENTES ATENDIDOS NO PROVOX/UFPB

Deyverson da Silva Evangelista¹; Fernanda Pereira França¹; Hérica Maria Oliveira Lima¹; Matheus Leão de Melo¹; Jonas Almeida de Freitas¹; Leonardo Wanderley Lopes².

Introdução: os distúrbios da voz referem-se a processos patológicos que afetam a produção da voz e assim representa qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a voz de cumprir seu papel básico de transmissão da mensagem verbal e emocional de um indivíduo, isto é, uma disfonia. Envolve, em geral, a estrutura e/ou funcionamento laríngeo, sendo ocasionados por fatores orgânicos ou funcionais e pode gerar desde sintomas sensoriais, a alteração da qualidade vocal e, impacto na qualidade de vida do paciente em suas atividades diárias que necessite do uso da voz. **Objetivo:** investigar a prevalência de distúrbios da voz em pacientes com queixa vocal em um serviço de triagem e avaliação vocal. **Métodos:** Participaram deste estudo 365 pacientes, de ambos os sexos, atendidos no ambulatório de Voz da Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba. Como critério de inclusão para este estudo, os pacientes deveriam apresentar queixa vocal e avaliação laringológica ou neurológica prévia à sessão de triagem vocal. Para a análise, os sujeitos foram alocados de acordo com o diagnóstico médico (laringológico e/ou neurológico). **Resultados:** Observou-se uma prevalência de 24,9% (n=91) de pacientes com diagnóstico de laringe normal, 23,3% (n=85) com nódulos, 11,2% (n=41) com cisto, 10,1% (n=37) com distúrbio de voz secundário a refluxo gastroesofágico, 9,3% (n=34) com fenda glótica sem causa orgânica ou neurológica, 5,7% (n=21) de doença de Parkinson, 5,5% com pólipos (n=20), 4,6% (n=17) com paralisia unilateral de prega vocal, 3% (n=11) com sulco vocal, 1,7% (n=6) com edema de Reinke, 0,3% (n=1) com papiloma laríngeo, e 0,3% (n=1) com granuloma. **Conclusão:** destaca-se que a maioria dos pacientes com queixa vocal não apresenta diagnóstico de lesão laríngea ou comprometimento neurológico, caracterizando a presença de distúrbio da voz de origem funcional. Entre os pacientes com queixa vocal e com presença de lesão laríngea, há uma maior prevalência de nódulos vocais.

Palavras-Chave: Alteração, Disfonia, Voz

1. aluno do curso de Fonoaudiologia, bolsista, deyverson_evangelista@hotmail.com; aluna do curso de Fonoaudiologia, colaborador, fernanda_fono1_@hotmail.com; aluna do curso de Fonoaudiologia, colaborador, herykalima02@hotmail.com; aluno do curso de Fonoaudiologia, colaborador, matheusmelo16@hotmail.com; aluno do curso de Fonoaudiologia, colaborador, jonas_almeida_pb@hotmail.com; 2. Orientador, lwlopes@hotmail.com.