

6CCMDPSMT01-P
---------------

### **METÁSTASE CUTÂNEA DE CÂNCER DE MAMA**

Adriana Furtado Honório<sup>(2)</sup>, Pablo Duarte Lima<sup>(2)</sup>,  
Jader Freire Sobral Filho<sup>(3)</sup>, Esther Palitot<sup>(4)</sup>, Mohamed Azzouz<sup>(4)</sup>.  
Centro de Ciências Médicas/ Departamento de Promoção da Saúde/ MONITORIA

#### **RESUMO**

A metástase cutânea é um fenômeno que resulta da disseminação do tumor por meio de embolização linfática ou vascular, implantação direta durante cirurgias, ou envolvimento da pele por contigüidade. As neoplasias primárias mais associadas à metástase cutânea incluem câncer de mama, pulmão e melanoma. Os tumores malignos primários que mais comumente metastatizam para a pele, em mulheres, são os de mama(70%). SSB, 56 anos, sexo feminino, branca, casada, do lar, natural de Barra de Santa Rosa- PB, procedente de João Pessoa. Queixava-se de insucesso terapêutico para herpes zoster há cerca de 3 semanas, cujas lesões atingiam principalmente mama e hemitórax esquerdos. Foi realizado exame histopatológico das lesões e instituída terapêutica com quimio e radioterapia para o câncer de mama. Metanálise. O carcinoma mamário representa, entre as mulheres, o tumor que mais freqüentemente produz metástases para a pele. Segundo *Brownstein & Helwig*, em um estudo sobre 724 pacientes portadores de metástases cutâneas, dos quais 242 do sexo feminino, o carcinoma mamário contribuiu com 69% dos casos. O padrão metastático das lesões varia bastante, inclusive em um mesmo paciente. As metástases para a pele de carcinomas internos são relativamente raras, principalmente o aspecto apresentado como zosteriforme. De acordo com *Brownstein & Helwig* já citados, entre 482 homens com metástases cutâneas, os carcinomas primitivos foram: pulmão, 24%, intestino grosso, 19%, melanoma, 13%, cavidade oral. 12%, rins, 6% e estômago, 6%. Entre 242 mulheres, os carcinomas primários foram: mama, 69%, intestino grosso, 9%, melanoma, 5%, ovário, 4% e pulmão, 4%. **CONCLUSÃO:** As metástases cutâneas devem ser prontamente reconhecidas, já que podem preceder o diagnóstico de uma doença maligna, embora na maioria das vezes indiquem uma doença já avançada, com prognóstico reservado. A maioria ocorre em locais próximos ao tumor primário, e a apresentação mais comum são nódulos indolores, firmes. Sendo a apresentação relatada no caso bastante incomum.

**Palavras-chave:** metastático, zosteriforme, metástase cutânea.

---

<sup>1)</sup> Bolsista, <sup>(2)</sup> Voluntário/colaborador, <sup>(3)</sup> Orientador/Coordenador <sup>(4)</sup> Prof. colaborador, <sup>(5)</sup> Técnico colaborador.