

6CCSDCOSMT12-P

VARIANTES CLÍNICAS DO LIQUEN PLANO - RELATO DE CASO CLÍNICO

Manuela Gouvêa Campêlo dos Santos⁽²⁾, Rachel Reinaldo Arnaud⁽¹⁾, Monique Danyelle Emiliano Batista Paiva⁽⁴⁾, Olívio Medeiros Batista⁽³⁾, Jaqueline Lopes Menezes da Silva⁽²⁾, Lino João da Costa⁽³⁾.

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Clínica e Odontologia Social /MONITORIA

RESUMO

O líquen plano constitui uma doença de interesse médico e odontológico, pois se trata de uma doença cutânea que afeta a boca com muita frequência. Sua etiologia ainda não foi completamente estabelecida, mas é provável que esteja relacionada com reação alérgica ou imune. A importância desta doença está relacionada com seu grau de frequência na população geral, sua multiplicidade de aspectos, e sua possível conexão com a malignidade. Sua manifestação bucal e/ou cutânea apresenta um variado espectro de características clínicas e, como consequência, os pacientes acometidos acabam por procurar os cuidados tanto dos dermatologistas como dos dentistas, tornando indispensável à integração entre estas duas especialidades. Vários tipos de líquen plano foram descritos na cavidade bucal, sendo a forma reticular a mais comum, caracterizada pela presença de numerosas linhas ou estrias ceratóticas. Há ainda a variante atrófica, erosiva e a bolhosa. O risco de transformação maligna tem sido associado e descrito principalmente em lesões localizadas na mucosa bucal. Assim este trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de uma paciente atendida na Clínica de Estomatologia- UFPB que apresenta, simultaneamente, diferentes formas clínicas bucais do líquen plano. As lesões estavam presentes há um ano e após exame clínico e histopatológico, o diagnóstico final foi de líquen plano.

Palavras chave: estrias ceratóticas, erosão, líquen.

¹⁾ Bolsista, ⁽²⁾ Voluntário/colaborador, ⁽³⁾ Orientador/Coordenador ⁽⁴⁾ Prof. colaborador, ⁽⁵⁾ Técnico colaborador.