

6CCSDCOSMT13-P
----------------

**CUNHA INTERPROXIMAL ASSOCIADA À RESTAURAÇÃO TRANSCIRÚRGICA  
UTILIZANDO RESINA COMPOSTA**

Anna Carolinna Nóbrega Gonçalves Coelho<sup>(2)</sup>, Germana Coeli de Farias Sales<sup>(2)</sup>, Laíza Tavares Alcântra de Pontes<sup>(2)</sup>, Rubênia Cristina Gomes de Medeiros<sup>(1)</sup>,  
Rosenês Lima dos Santos<sup>(3)</sup>.

Centro de Ciências da Saúde/ Departamento de Clínica e Odontologia Social/ MONITORIA

**RESUMO**

A cunha interproximal é o procedimento cirúrgico periodontal mais empregado, principalmente em restaurações de cavidades classe II que possuem extensão marginal subgengival. A técnica da cunha interproximal é realizada especificamente para remoção da papila interproximal. No caso de haver aumento de tecido gengival (hiperplasia gengival) e este ser o motivo da extensão subgengival do preparo, podemos optar pelas técnicas cirúrgicas periodontais, especificamente, a cirurgia de cunha interproximal, e, se houver comprometimento das distâncias biológicas, a cunha interproximal deverá incluir a osteotomia através da cirurgia a retalho, o que possibilitará acesso direto ao osso alveolar. Nas situações em que é indicado o procedimento cirúrgico, o primeiro passo é determinar se houve ou não à invasão do espaço biológico. Para tal, devemos realizar uma tomada radiográfica para auxiliar na visualização da distância entre a crista óssea alveolar e a margem cervical do preparo. Desse modo, o objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico, executado na clínica de Dentística Clínica II, de cunha interproximal entre os elementos 46 e 47 com necessidade de recuperação do espaço biológico do elemento 47 e confecção de restauração transcirúrgica em resina composta. Face ao exposto, pôde-se concluir que o posicionamento das restaurações em margens biologicamente aceitáveis é a condição ideal para a confecção de um correto preparo, restauração e acabamento da mesma, bem como possibilita uma melhor higienização da área restaurada. Contudo, existem situações que exigem a colocação destas margens subgengivalmente, inclusive com necessidade de recomposição das distâncias biológicas para confecção de uma correta restauração.

**Palavras chave:** restauração, interproximal, subgengivalmente.

---

<sup>1)</sup> Bolsista, <sup>(2)</sup> Voluntário/colaborador, <sup>(3)</sup> Orientador/Coordenador <sup>(4)</sup> Prof. colaborador, <sup>(5)</sup> Técnico colaborador.