

6CCSDEMCAMT04

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM INDIVÍDUOS COM AIDS: LEVANTAMENTO EM ESTUDOS CLÍNICOS DE 2005 A 2007

Iara Coeli da Nóbrega Costa ⁽¹⁾, Millena Lyciane Costa Fernandes ⁽¹⁾, Danieli Pereira Santana ⁽²⁾, Uthania Melo de França ⁽³⁾.

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica e Administração/MONITORIA.

RESUMO

No compromisso do enfermeiro com a otimização do cuidar destaca-se seu papel na saúde pública, envolvendo prevenção, tratamento e controle das doenças transmissíveis e de grandes epidemias que assolam o mundo, como a AIDS, nas últimas décadas. Para a otimização desse cuidado, o enfermeiro dispõe de um método, o Processo de Enfermagem, que deve ser desenvolvido a partir dos problemas identificados, ou seja, dos diagnósticos de enfermagem denominados pela *North American Nursing Diagnosis Association – NANDA* (Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem). Trata-se de um estudo descritivo, de caráter documental, que teve como objetivo o levantamento dos diagnósticos de enfermagem mais frequentes identificados em indivíduos com AIDS nos estudos clínicos desenvolvidos pelos alunos da disciplina Enfermagem em Clínica II no período de 2005 a 2007. A população foi constituída de todos os estudos clínicos e a amostra 23 que envolviam indivíduos com AIDS. Foi realizado no Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgica e Administração - DEMCA/ CCS/ UFPB. A análise dos dados conduziu à identificação de 13 diagnósticos de enfermagem, com uma média de quatro diagnósticos por estudo clínico, podendo um diagnóstico ser contemplado em mais de um estudo. Em algumas situações, quando o julgamento clínico conduziu à identificação de diagnóstico de enfermagem, em forma de fator relacionado, este último foi computado como diagnóstico de enfermagem. Houve uma frequência \geq a 43% em três diagnósticos: Risco para infecção, Integridade da pele prejudicada e Nutrição alterada: ingestão menor do que as necessidades corporais; entre outros de menor frequência como Dor, Ansiedade, Risco para volume de líquidos deficiente, Fadiga, Conhecimento deficiente e Mobilidade física prejudicada. Conclui-se que os diagnósticos identificados retratam o enfrentamento da doença no aspecto biopsicossocial exigindo do enfermeiro um olhar holístico, bem como possibilitam a construção de um instrumento em estudos mais aprofundado, para a sistematização da assistência de enfermagem nesta clientela específica.

Palavras Chave: Diagnóstico de Enfermagem; AIDS; Assistência de Enfermagem.

¹⁾ Bolsista, ⁽²⁾ Voluntário/colaborador, ⁽³⁾ Orientador/Coordenador ⁽⁴⁾ Prof. colaborador, ⁽⁵⁾ Técnico colaborador.